

با تقسیم میتوز، توده ای از یاخته های **هم شکل** را به وجود می آورند که کال نامیده می شود. کال می تواند به گیاهانی تمایز باید که از نظر ژنی یکسان اند

* گل، ساختاری اختصاص یافته برای تولید مثل **جنسی** است و می تواند دارای گلبرگ، کاسبرگ، پرچم و مادگی باشد. نهنچ وسیع بوده و ممکن است صاف، گود یا برآمده باشد

نکته: نهنچ قسمتی از گل نیست!

* اجزای گل در چهار حلقه‌ی هم مرکز تشکیل می شوند که از خارج به داخل عبارتند از:

- کاسبرگ **ها**: در خارجی ترین حلقه قرار دارد (و **وظیفه مغایله** از عنقچه رو پر عهده داره)

- گلبرگ **ها**: **معمولًا** به رنگ های متفاوت وجود دارند. رنگی بودن گلبرگ ها سبب جلب جانوران گرده افسان می شود.

- پرچم **ها**: هر پرچم **معمولًا** از یک میله رشتہ مانند و یک ساک تشکیل شده است. ساک در بالای میله قرار دارد و در آن، کیسه های گرده تشکیل می شوند

- **مادگی**: از یک یا چند برچه ساخته شده است. در واقع برچه واحد سازنده مادگی است در مادگی های چند برچه ای، ممکن است فضای مادگی با دیواره برچه ها از هم جدا شوند

دقیق کنید هیچ گلی پیشتر از یک مادگی ندارد! اما می تواند چند برچه داشته باشد

نکته: کاسبرگ ها برخلاف گلبرگ ها **فتونتنتز** کننده هستند

* گلی که هر چهار حلقه را داشته باشد **گل کامل**، و در غیر اینصورت **گل ناکامل** نامیده می شود

* گلی که هم پرچم و هم مادگی داشته باشد **گل دو جنسی** و گلی که فقط یکی از این دو را دارد **گل تک جنسی** نام دارد


نکته: هر گل کاملی قطعاً دو جنسی است

نکته: هر گل تک جنسی قطعاً ناکامل است

نکته: گیاه کدو، گل های تک جنسی و گلبرگ های پیوسته دارد

* گامت نر در گیاهانی مانند خزه (و سرخس)، وسیله حرکتی دارد و می تواند در محیط مایع به سمت گامت ماده حرکت کند.

* گامت نر در گیاهان گل دار وسیله حرکتی ندارد و لوله گرده به انتقال آن کمک می کند



* تنها گروهی از گیاهان که گل تولید می کنند، **نهان دانگان** هستند. این گیاهان بیشترین گیاهان روی زمین هستند * گوناگونی حشره ها در زیستگاهی با گیاهان گل دار، بیشتر است

* **معمولًا** برای تکثیر گیاهان از بخش های رویشی گیاه (یعنی ساقه، برگ و ریشه) استفاده می کنیم

* روی ریشه ای درخت آبلالو، جوانه هایی تشکیل می شود که از رشد آنها درخت های آبلالو ایجاد می شوند

قلمه زدن: قرار دادن قطعه هایی از **ساقه** در خاک یا آب

پیوند زدن: قطعه ای از یک گیاه مانند جوانه یا شاخه (پیوندک)، روی **ته** گیاه دیگری (پایه)، پیوند زده می شود

نکته: هم گیاه پایه و هم گیاهی که پیوندک از آن گرفته می شود، ویژگی های مطلوب و متفاوتی دارند

خوابانیدن: بخشی از ساقه یا شاخه را که دارای گره است، با خاک می پوشانند. بعد از مدتی از محل گره، ریشه و

ساقه ای برگدار ایجاد می شود که با جدا کردن از گیاه مادر، پایه جدیدی ایجاد می شود

نکته: در هر سه روش بالا، می توان از **ساقه** برای تکثیر رویشی گیاه استفاده کرد!

* **نمونه هایی از ساقه های ویژه شده برای تولید مثل غیر جنسی:**

- **زمین ساقه (Rizom):** به طور افقی در زیر خاک رشد می کند و همانند ساقه هوایی جوانه انتهایی و جانی دارد.

این ساقه به موازات رشد افقی خود در زیر خاک، پایه های جدیدی در محل جوانه ها تولید می کند. **زنبق** و **گندمیانی** مانند

مرغ، زمین ساقه دارند

- **غده:** ساقه ای **زیرزمینی** است که به علت ذخیره ماده ای غذایی در آن، متورم شده است. **سبز زمینی** نوعی غده است

- **پیاز:** ساقه زیرزمینی کوتاه و دکمه مانندی دارد که برگ های خوراکی به آن متصل اند. **پیاز خوراکی**، **نرگس** و **لاله**

پیاز دارند. از هر پیاز تعدادی پیاز کوچک تشکیل می شود که هر یک خاستگاه یک گیاه می شوند

- **ساقه رونده:** به طور افقی روی خاک رشد می کند. گیاه توت فرنگی ساقه رونده دارد. گیاهان توت فرنگی جدیدی

در محل گره ها ایجاد می شوند

نکته: در تمام انواع ساقه های تخصص یافته، ساقه در زیر خاک قرار می گیرد؛ بجز ساقه ای رونده

نکته: در پیاز، گیاه جدید از خود پیاز حاصل می شود. ولی در سایر ساقه های ذکر شده، از جوانه ای ساقه ایجاد می شود

نکته: در گیاه پیاز خوراکی، برگ ها قابل خوردن هستند نه ساقه!

* **گندمیانی** مانند **مرغ** که زمین ساقه دارند، ضمن اشغال سطح وسیعی از خاک، در ثبت آن نیز نقش دارند

* از فن کشت بافت برای تولید گیاهان با ویژگی های مطلوب و تولید انبوه آنها در **آزمایشگاه** استفاده می شود. در این فن،

یاخته یا **قطعه ای از بافت گیاهی** (نه قطعه ای از یاخته!) در محیط کشت گذاشته می شود. یاخته و بافت در شرایط مناسب،

- * گرده افشاری به وسیله باد، آب و جانوران انجام می گیرد
- * در صورتی که کلاله گرده را پذیرد، از رشد (**نه تقسیم!**) یاخته رویشی، لوله گرده تشکیل می شود. لوله گرده به درون بافت کلاله و خامه نفوذ می کند و همراه با خود، دو گامت نر را که از تقسیم یاخته زایشی در لوله گرده ایجاد شده اند، به سمت تخمک و کیسه رویانی می برد

نکته: در لوله گرده **۳ نوع** هسته قابل مشاهده است: **۱_ هسته خود لوله گرده**

۲_ هسته سلول زایشی **۳_ هسته ی گامت های حاصل از سلول زایشی**

نکته: همه گامت های در بخش ماده **گیاه حاصل می شوند**

نکته: یاخته رویشی از یاخته زایشی حجمی تر است

نکته: مطابق شکل کتاب، هسته یاخته زایشی همزمان با رشد آن جلو می رود

و در مجاورت تخمک قرار می گیرد

- * از آمیزش یکی از اسپرم ها با یاخته تخم زا، **تخم اصلی** تشکیل می شود. این تخم به رویان نمو می یابد. اسپرم دیگر با یاخته دو هسته ای آمیزش می یابد که نتیجه آن تشکیل **تخم ضمیمه** است. به دلیل انجام این دو لقا، نهان دانگان لقا مضاعف دارند.

نکته: تخم ضمیمه، تریپلوفیلیدی و تخم اصلی دیپلوفیلیدی است

- * تخم ضمیمه با تقسیم های متواالی بافتی به نام درون دانه (آندوسپرم) را ایجاد می کند.

این بافت از یاخته های **پارانشیمی** ساخته شده و ذخیره غذایی برای رشد رویان است

- * اگر هسته تخم ضمیمه تقسیم شود، اما تقسیم سیتوپلاسم انجام نگیرد، بافت آندوسپرم به صورت **مایع** دیده می شود. شیر نارگیل مثالی از چنین آندوسپرمی است. در حالی که بخش گوشتی و سفید رنگ نارگیل، آندوسپرمی است که در آن تقسیم سیتوپلاسم نیز انجام شده است

- * پیکر جانوران گرده افشار، هنگام تغذیه از گل ها به دانه های گرده آغشته می شود و به این ترتیب، دانه های گرده را از گلی به گل دیگر منتقل می کنند. **رنگ های درخشان**

بوهای قوی و شهد گل ها از عوامل جذب جانوران به سمت گل ها هستند

- * زنبورهای عسل گل هایی را گرده افشاری می کنند که شهد آنها قدر فراوانی داشته باشد؛

- * کیسه های گرده در بساک تشکیل می شوند و یاخته های دیپلوفیلیدی دارند. از تقسیم میوز هر کدام از این یاخته ها، چهار یاخته هاپلوفیلید تشکیل می شود که **گرده های نارس** نام دارند. هر یک از این یاخته ها، با یک بار تقسیم میتوز و ایجاد تغییراتی در دیواره، به **دانه گرده رسیده** تبدیل می شود. دانه گرده رسیده **یک دیواره خارجی**، **یک دیواره داخلی**، **یک یاخته رویشی** و **یک یاخته زایشی** دارد.

نکته: هم گرده های نارس و هم گرده های رسیده، هاپلوفیلید هستند

- * تخدمان محل تشکیل تخمک هاست. تخمک جوان پوششی دو لایه ای دارد که یاخته های دیپلوفیلیدی را در بر می گیرد. مجموع این یاخته ها، بافت خورش را می سازند. **یکی از** یاخته های بافت خورش بزرگ می شود و با تقسیم میوز چهار یاخته هاپلوفیلیدی ایجاد می کند. از این چهار یاخته فقط یکی باقی می ماند (**یاخته ای که اندازه بزرگتر دارد!**) که با تقسیم میتوز، ساختاری به نام کیسه رویانی با تعدادی یاخته ایجاد می کند (**دقّت کنید** تعداد هسته های کیسه رویانی از تعداد یاخته های آن یک عدد پیشتر است: **۷ یاخته و ۸ هسته**). تخم زا و یاخته دو هسته ای از یاخته های کیسه رویانی اند

که در لقا با گامت های نر شرکت می کنند

نکته: یاخته های بافت خورش دیپلوفیلید بودند

و یاخته های کیسه رویانی هاپلوفیلید هستند

نکته: تقسیم میوز سلول بافت خورش،

با تقسیم نامساوی سیتوپلاسم همراه است.

یعنی صفحه یاخته ای ایجاد شده توسط

دستگاه گلزاری که منجر به تولید تیغه

میانی می شود، در میانه ای سلول


قرار نمی گیرد !

قرار می گیرند

نکته: یاخته ای تخم زا از یاخته های مجاور خود حجمی تر است

- * با شکافت دیواره بساک، گرده ها رها می شوند. **دیواره خارجی** دانه های گرده منفذدار بوده و ممکن است **صف** یا **دارای تزئیناتی** باشد

نکته: طبق شکل کتاب، بساک از دو انتهای شروع به شکوفایی می کند !



نکته: ریشه لوپیا که گیاهی دولپه ای است یک تکه و دارای انشعاباتی است. اما ریشه ذرت

(که تک لپه است) به صورت افشار می باشد

نکته: ریشه ذرت برخلاف لوپیا در خارج از سطح خاک نیز دیده می شود

نکته: ساقه لوپیا هنگام خروج از خاک ابتدا خمیده و قلاب مانند است و سپس صاف می شود

اما ساقه ذرت به طور مستقیم از خاک خارج می شود

* میوه ای که از رشد تخدمان ایجاد شده، **میوه حقیقی** نامیده می شود (مثل هلو)

در غیر این صورت (یعنی اگر در تشکیل میوه قسمت های دیگری از گل نقش داشته باشند)،

میوه کاذب است (مثل سیب که حاصل رشد نهنج است)

* میوه ها علاوه بر حفظ دانه ها، در پراکنش آنها نقش دارند. باد و آب و جانوران

می توانند سبب انتقال میوه ها و دانه ها شوند. پوسته **بعضی** دانه ها چنان سخت و محکم

است که حتی در برابر شیره های گوارشی جانوران سالم می مانند

* اگر بین تخم زا و اسپرم لقاد رخ ندهد، دانه ای ایجاد نمی شود! با این روش پرتفال های

بدون دانه را تولید می کنند. البته اگر لقاد انجام شود اما رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و

نمود از بین برود، دانه های نارسی تولیده شده که ریزنده و پوسته ای نازک دارند. به چنین

میوه هایی نیز، میوه بدون دانه می گویند (**یادآوری**: برای تولید میوه های بدون دانه و

درشت کردن میوه ها، از هورمون جیرلین استفاده می شود)

گیاهان یک ساله: در مدت یک سال یا کمتر، رشد و تولید مثل می کنند و سپس از

بین می روند (مثل خیار و گندم)

گیاهان دو ساله: این گیاهان در سال اول رشد رویشی دارند و در سال دوم با تولید گل و

دانه، رشد زایشی دارند (مثل شلغم و چغندر قند)

گیاهان چند ساله: این گیاهان سال ها به رشد رویشی خود ادامه می دهند (مثل درختان،

درختچه ها و زنبق). بعضی از آن ها هر ساله می توانند گل، دانه و میوه تولید کنند

نکته: تمام گیاهان یک ساله و دو ساله علفی هستند



این گل ها علائمی دارند که فقط در نور فرابنفش دیده می شوند و زنبور را به سوی شهد گل هدایت می کنند

* گرده افسانی **بعضی** گیاهان وابسته به باد است. این گیاهان تعداد فراوانی گل های کوچک تولید می کنند و فاقد

رنگ های درخشان، بوهای **قوی** و **شیره** اند. **نکته:** زنبور عسل توانایی تشخیص نور فرابنفش را دارد

نکته: گل هایی که گرده افسانی آن ها را خفاش ها انجام می دهند، سفید رنگ هستند

* رویان از تقسیم پی در پی یاخته تخم تشکیل می شود. در اولین تقسیم میتوز این یاخته، دو یاخته ایجاد می شود که

یکی بزرگ و دیگری کوچک است (تقسیم نا مساوی میان یاخته). یاخته کوچک منشا رویان است. از تقسیم یاخته بزرگ،

بخشی به وجود می آید که ارتباط بین رویان و گیاه مادر را برقرار می کند

نکته: در ابتداء سرعت تقسیم یاخته بزرگتر بیشتر است و یاخته های بیشتری تولید میکند؛ اما در ادامه سرعت تقسیم

یاخته های رویانی افزایش می یابد و تعداد زیادی یاخته حاصل می شود

قسمت های مختلف دانه عبارتند از :

- **پوسته:** پوسته تخمک تغییر می کند و به پوسته دانه تبدیل می شود. (**دقّت کنید** پوسته دانه ژن نمود پوسته تخمک را

دارد نه الزاماً ژن نمود رویان را. یعنی دارای ژن نمود کیاه مادر است!)

- **رویان:** لپه ها مشخص ترین بخش رویان اند. ساقه و ریشه ای رویانی نیز در دو انتهای رویان تشکیل می شوند

- **ذخیره غذایی:** ذخیره غذایی همان آندوسپرم است که هنگام رشد رویان به مصرف می رسد

* ممکن است آندوسپرم به عنوان ذخیره دانه باقی بماند، یا اینکه جذب لپه ها شود. مثلاً آندوسپرم، ذخیره دانه در ذرت

است و نقش لپه، انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویان در حال رشد است

نکته: در دانه ذرت، آندوسپرم حجمی ترین بخش دانه هست و لپه بین آن و ریشه و ساقه رویانی قرار دارد

* در دانه **لوپیا**، مواد غذایی آندوسپرم جذب لپه ها شده و لپه ها بزرگ می شوند.

* در بسیاری از گونه ها، لپه ها از خاک بیرون می آیند و به مدت کوتاهی فتوستن می کنند. به همین خاطر به آن ها

برگ های رویانی نیز می گویند

* پوسته دانه ها **ممولا** سخت است. این پوسته، رویان را در برابر شرایط نامساعد محیط و صدمه های فیزیکی یا شیمیایی

حفظ می کند ۲_ با جلوگیری از ورود آب و اکسیژن به دانه مانع از رشد **سریع** رویان می شود (نه **توقف دائمی و کامل رشد!**)

* دانه برای رویش به **آب**، **اکسیژن** و **دمای مناسب** نیاز دارد. جذب آب سبب شکاف برداشتن دانه و ورود اکسیژن می شود

* در نهان دانگان بر اساس اینکه لپه ها درون خاک بمانند یا همراه با ساقه از خاک خارج شوند، به ترتیب :

رویش زیر زمینی (**مثل ذرت**) و رویش رو زمینی (**مثل لوپیا و پیاز**) تعریف شده است.