

هورمون های گیاهی (تنظیم کننده های رشد)


| حرکت های رشد | | |
|---|---|--|
| بازدارنده های رشد | آبسیزیک اسید | کسبین ها |
| رویش گیاهان را در پاسخ به شرایط نامساعد ، کاهش می دهد | عامل بسته شدن روزنه ها و در نتیجه حفظ آب گیاه و همچنین مانع از رویش دانه و رشد جوانه ها در شرایط نامساعد است - به طور کلی از گیاهان را در پاسخ به شرایط نامساعد | افزایش طول طولی یاخته - تحریک ریشه زایی و تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از قلمه - تشکیل میوه های بدون دانه و درشت کردن میوه - تولید سومومی برای از بین بردن بعضی دو لپه ای ها - چیرگی راسی معروف به هورمون های جوانی - تحریک تقسیم یاخته ای و به تأخیر اندختن پیری - افسانه (اسپری) شدن بر روی برگ و گل - در کشت بافت ، سبب ایجاد ساقه از یاخته های تمایز نیافته می شوند |
| برگ و ریزش میوه - توقف رشد جوانه های جانی | از میوه های رسیده و بافت های آسیب دیده گیاه و سوختن سوخت های فسیلی ، اتیلن تولید می شود - رسیدن میوه های نارس- ریزش | افزایش طول طولی با تحریک رشد طولی و تقسیم یاخته - رشد میوه - رویش دانه - تولید میوه های بدون دانه و درشت کردن میوه عامل بسته شدن روزنه ها و در نتیجه حفظ آب گیاه و همچنین مانع از گیاهان رسیده و بافت های آسیب دیده گیاه و سوختن سوخت های فسیلی ، اتیلن تولید می شود - رسیدن میوه های نارس- ریزش |
| نقش دارند | اتیلن (گازی شکل) | سیتوکینین ها |

* عامل نارنجی که مخلوطی از اکسین ها بود ، سبب تخریب بعضی گیاهان دو لپه ای می شد
این ماده در انسان سبب سرطان و تولد نوزادان با نقص های مادرزادی می شد.

دقچ کنید اکسین در ساقه صرف سبب افزایش رشد طولی یاخته می شود نه تکثیر آن ها !
(ما) از آنچهایی که ریشه زایی را نیز تحریک می کند ، می تواند در تقسیم یاخته ای در ریشه نیز موثر باشد

چیرگی راسی : به اثر بازدارنده گیاه راسی بر رشد جوانه های جانی ، چیرگی راسی می گویند . با قطع جوانه راسی ، مقدار سیتوکینین در جوانه های جانی افزایش و مقدار اکسین آن ها کاهش می یابد در نتیجه جوانه های جانی رشد می کنند .
اگر بعد از قطع جوانه راسی ، در محل برش ، اکسین قرار دهیم ; جوانه های جانی رشد نمی کنند در نتیجه می فهمیم اکسین از جوانه راسی به جوانه های جانی می رود و مانع از رشد آنها می شود . اکسین جوانه راسی ، تولید اتیلن در جوانه های جانی را تحریک می کند و در نتیجه با افزایش اتیلن در جوانه های جانی ، رشد آنها متوقف می شود .

- * خم شدن گیاهان به سمت نور پدیده ای رایج در طبیعت است
- * داروین و پسرش از آزمایش بر روی چمن که از گندمیان است ، دریافتند دانه رُست در صورتی به سمت نور یک جانب نوری که از یک طرف به گیاه می تابد) خم می شود که نوک آن در برابر نور باشد .
- * محققان دیگر (نه داروین!) متوجه شدند که عامل خم شدن دانه رُست به سمت نور، ماده ای است که در نوک گیاه وجوددارد



* نور باعث تجمع اکسین در سمت سایه می شود (تجمع را با تولید اشتباه تکثیرید ! در همان محل ساقه تولید می شود اما نور باعث چاپی آن به سمت سایه می شود) در اثر تجمع اکسین در سمت سایه ، یاخته های این قسمت رشد طولی کرده (با تقسیم اشتباه تکثیرید !) و ابعاد این یاخته ها از یاخته های سمت نور بیشتر می شود . در نتیجه گیاه به سمت نور خم می شود

نکته: اکسین در هر طرف تجمع یابد ، گیاه به سمت مخالف آن خم می شود

* رشد جهت دار اندام های گیاه در پاسخ به نور یک جانب را نورگرایی نامیدند . کلمه اکسین به معنای رشد کردن است .
انواعی از ترکیبات مشابه اکسین در گیاهان متفاوت ساخته می شوند که اثرات مشابه دارند ; این گروه از ترکیبات ، اکسین ها نامیده شدند .

دقچ کنید اکسین نام یک ترکیب خاص است و اکسین ها ، خود اکسین و ترکیبات مشابه آن را شامل می شود

* تنظیم کننده های رشد یا هورمون های گیاهی ، ترکیباتی هستند که رشد و فعالیت گیاهان را کنترل می کنند
محرك های رشد : در فرایندهای رشد مانند تحریک تقسیم یاخته ، رشد طولی یاخته ها ، ایجاد و حفظ اندام ها نقش دارند .
گرچه این تنظیم کننده ها را به عنوان محرك رشد می شناسیم ؛ اما بر اساس مقدار و محل اثر ممکن است نقش باز دارندگی نیز داشته باشند

باز دارنده های رشد : در فرایندهای متفاوتی مانند مقاومت گیاه در شرایط سخت ، رسیدگی میوه ها ، ریزش برگ و میوه

| | | |
|------------|--|-----------|
| مثال | تقسيم بندی گیاهان گل دار (بر اساس نياز به نور برای گل دهی) | |
| گیاه داودی | در روز های کوتاه پاییز گل می دهد . به شب طولاني نياز دارد | روز کوتاه |
| شبدر | در تابستان گل می دهد . به شب کوتاه نياز دارد | روز بلند |
| گوجه فرنگی | شامل بعضی گیاهان است که وابسته به طول شب و روز نیستند | بی تفاوت |

نکته فعالیت : شکستن شب های طولانی با جرقه نوری (مثل چراغ قوه) ، سبب گل دهی گیاهان روز بلند ، و همچنین عدم گل دهی گیاهان روز کوتاه می شود

* گیاهان هر دمايی را نمي توانند تحمل کنند . سرمای شدید می تواند مانع از رویش دانه ها و جوانه ها شود . بعضی گیاهان علاوه بر نياز های نوری ، برای گل دادن نياز به گذراندن يك دوره سرما نيز دارند . مثلا برای **نوعی گیاه** گندم مشاهده شده است که اگر بذر آن را مرطوب کنیم و در سرما قرار دهیم ، دوره رویشی آن کوتاه می شود و زودتر گل می دهد (دقت کنید که زودتر گل می دهد : نه اينکه سرما برای گل دهی آن الزامي باشد !)

* ساقه در خلاف جهت گرانش و ريشه درجهت گرانش زمين رشد می کند (البته دقت کنید اين موضوع در مواردي مثل زمين ساقه که افقی رشد می کند ، صادق نیست) رشد جهت دار اندام های گیاه نسبت به گرانش زمين ، زمين گرایی نamideh می شود

* ساقه درخت مو در تماس با درختی ديگر و يا پايه ، به دور آن می پيچد . پيچش به علت تفاوت رشد ساقه در بخش قرار گرفته روی تکيه گاه و سمت مقابل آن ایجاد می شود ; به طوری که رشد ياخته ها در محل تماس کاهش می يابد

نکته : پيچش به علت تفاوت در رشد ياخته ها است ; نه تفاوت در تکثير آن ها

توضیح و یادآوری : اگر رشد چاندار رو در نظر پگيريم دونوع رشد داريم : افرایش غیرقابل بازگشت ابعاد ياخته ها ۲- تقسيم و تکثیر ياخته ها (اما در مورد رشد ياخته ها ، فقط پرگرگ شدن مود ياخته رو پايد در نظر پگيريم)



نکته مهم : توجه کنید خود اكسيني که از جوانه راسي به جوانه جانبي می آيد ، مستقيماً مانع رشد آن ها می شود . اما توليد اتيلن در جوانه های جانبي ، بر اثر اكسين موجود در جوانه راسي است ! نه اكسيني که به جوانه های جانبي آمده !

نکته : اكسين ، محرك رشد در راس گیاهان و بازدارنده رشد در جوانه های جانبي است

نکته فعالیت : در فن کشت بافت ، هم برای ایجاد ساقه و هم برای ایجاد ريشه ، سیتوکینين و اكسين هردو لازم هستند اما با نسبت ها و غلظت های متفاوت

نکته : نقش آبسيزirk اسيد و اكسين ها در رشد جوانه های جانبي ، مشابه و در جوانه راسي مخالف يکديگر است

نکته : می توان گفت اتيلن سبب تشکيل رنگ ديسه در ميوه گوجه فرنگی می شود

نکته : سیتوکینين ها ، جيبرلين ها و اكسين ها برخلاف اتيلن و آبسيزirk اسيد ، هر کدام گروهي از ترکيب ها هستند : نه يك ترکيب !

نکته : توجه کنید که آبسيزirk اسيد فقط می تواند سبب بسته شدن روزنه ها شود و در باز شدن آن ها نقشي ندارد ! (كنكور ۹۵)

* دانشمندان ژاپنی با استخراج و شناسایی ترکیبات به دست آمده از **قارچ جيبرلا** ، جيبرلين ها را شناسایی و معرفی کردند

* آلدگی دانه رست های برنج به قارچ جيبرلا ، سبب رشد سريع و خم شدن و روی زمين افتادن اين گیاهان می شود ؛ در نتيجه محصول برنج کاهش می يابد

* رویان **غلات** در هنگام رویش دانه ، مقدار فراوانی جيبرلين می سازند (دانه اي که هنوز رویش را شروع نکرده و په اصطلاح حفته است ، جيبرلين دارد !) . اين هورمون بر خارجي ترين لایه آندوسپرم (لایه گلوتن دار) اثر می گذارد و سبب توليد و رهاشن آنزيم های گوارشي در دانه می شود . اين آنزيم ها **ديواره ياخته ها** (پرای تجهيزه دیواره چه آنزيم هایي لازم بود ؟ پس پايد پروتئاز و انواعي از کربوهيدرات در دانه **توليد شود**) و **ذخایر آندوسپرم** را تجزيه می کنند . نشاسته يکي از اين ذخایر است که بر اثر آنزيم آميلاز تجزيه می شود

دقت کنید جيبرلين را رویان ، و آنزيم های گوارشي را لایه گلوتن دار می سازد

* درختان با کاهش سرما گل می دهند (البته دقت کنید که فقط همان دانگان گوانی یکي تولید کل دارند ؛ و درختان مثل پاژدانگان ، کل تولید نمی کنند) . گلبرگ های بعضی گیاهان در شب بسته می شوند

* بعضی گیاهان در فصلی خاص و بعضی در همه فصل ها گل می دهند . گیاه هنگامی گل می دهد که سرلاط رویشي که در جوانه قرار دارد ، به سرلاط گل يا زايشي تبدیل شود . این تبدیل به شرایط محیطی مانند **دما** و **طول روز و شب** وابسته است

- * **۷_ محافظت توسط جانوران :** مورچه ها به جانوران کوچکی (حشره، پستاندار کوچک و گیاهان دارزی) که قصد خوردن برگ های درخت آکاسیا را دارند، حمله می کنند
- * گرده افشاری درخت آکاسیا به وسیله زنبور هاست . وقتی گل های آکاسیا باز می شوند ، نوعی ترکیب شیمیایی تولید و منتشر می کنند که با فراری دادن مورچه ها مانع از حمله آن ها به زنبورهای گرده افشار می شود
- * بعضی گیاهان در برابر حمله گیاه خواران ، مواد فراری تولید و در هوا پخش می کنند که سبب جلب جانوران دیگر می شود. یک نمونه از این فرایند در شکل زیر قابل مشاهده است :



دقچ کنید ترکیبات فراری را که از یاخته های آسیب دیده ی گیاه تباکو ترشح می شود ، پا نیکوتین و آکالولئید ها (اشتهاه نگیرید !)

دقچ کنید زنبور مادر، نوزاد کرمی شکل را نمی کشد ! پلکه این نوزاد کرمی شکل ، در اثر تقدیمه نوزادان زنبور می میرد

- * ضربه زدن به برگ (نه گل !) گیاه حساس ، باعث بسته شدن برگ های آن می شود (یادآوری : گلبرگ بعضی گیاهان در شب بسته می شود)
- * در برگ گیاه گوشت خوار ، کرک ها نقشی معادل گیرنده ی حسی جانوران دارند و با راه اندازی پیام هایی سبب به دام انداختن حشره توسط برگ می شوند . در تعدادی از گیاهان ، برگ ها کرک هایی دارند که حشره های کوچک نمی توانند روی این برگ های کرک دار به راحتی حرکت کنند (استفاده از کرک به منظور دفاع : نه شکار !)
- * زنگ گندم و سیاهک گندم ، قارچ هایی هستند که سبب تخریب محصولات کشاورزی می شوند
- * **عوامل دفاعی گیاهان :**

- ۱_ پوستک تا حدودی مانع از ورود عوامل بیماری زا می شود
- ۲_ دیواره یاخته ای نیز محکم است و عبور از آن کار دشواری است همچنین در دیواره ممکن است لیگنین یا سیلیس وجود داشته باشد که سبب سخت تر شدن آن می شوند
- ۳_ بافت چوب پنبه نیز در اندام های مسن گیاهان ، علاوه بر حفظ آب ، مانعی در برابر عوامل آسیب رسان است
- ۴_ کرک و خار نیز در دفاع از گیاهان نقش دارند
- ۵_ بعضی گیاهان در پاسخ به زخم ، ترکیباتی ترشح می کنند که در محافظت از آنها نقش دارند . گاه حجم این ترکیبات آنقدر زیاد است که حشره در آن به دام می افتد . با سخت شدن این ترکیبات ، سنگواره هایی ایجاد می شود که حشره در آن حفظ شده است (دقچ کنید در سنگواره ایجاد شده ، گیاه ترکیبات را به منظور محافظت از زخم ها ترشح کرده است نه برای به دام انداختن حشدار !)

۶_ دفاع شیمیایی :

- تعدادی از گونه های گیاهی ترکیبات سیانید دار تولید می کنند که پس از تجزیه این ترکیبات و تولید سیانید ، سبب اختلال در تنفس یاخته ای شده و مرگ یا بیماری گیاه خواران را به دنبال دارد .
- آلkalوئیدها در دور کردن گیاه خواران نقش دارند . نیکوتین که از آلkalوئیدهاست ، چنین نقشی در گیاه تباکو دارد
- * گیاهان سازوکار های متفاوتی برای جلوگیری از اثر این مواد بر فرایندهای یاخته ای خود دارند . یکی از این سازوکارها ، تولید موادی است که به خودی خود سمی نیستند اما پس از تجزیه توسط گیاه خوار ، سمی می شوند . مثل ترکیبات سیانید دار
- ۷_ مرگ یاخته ای :** ورود ویروس در گیاه فرایندهایی را به راه می اندازد که نتیجه آن ، مرگ یاخته های آلوده و قطع ارتباط آن ها با بافت های سالم است . در مرگ یاخته ای ، یاخته به وسیله آنزیم های خود گوارش می شود . (سالیسیلیک اسید که از تنظیم کننده های رشد گیاهان است ، در مرگ یاخته ای نقش دارد)

