


سؤالات خط به خط امتحان نهایی : زیست دوازدهم تجربی فصل ۷ : فناوری های نوین زیستی

| زیست فناوری و مهندسی ژنتیک | | | |
|----------------------------|-------------------|--|----|
| ۰/۲۵ | ۹۴/۶ - ۹۰/۱۲ | جانداری که از طریق مهندسی ژنتیک دارای ترکیب جدیدی از مواد ژنتیکی شده است، اصطلاحاً چه می نامند ؟ تراژنی | ۱ |
| ۰/۵ | ۹۸/۱۰ | جواب مثل سؤال ۱ | ۲ |
| ۰/۲۵ | ۹۸/۱۰-۹۸/۶ | جداسازی یک یا چند ژن و تکثیر آن ها را می گویند. | ۳ |
| ۰/۵ | ۸۹/۱۰ - ۹۰/۶ | تولید انبوه ژن و فراورده های آن یکی از مهم ترین اهداف مهندسی ژنتیک را بنویسید . | ۴ |
| ۰/۵ | ۹۰/۴ | منظور از همسانه سازی DNA چیست ؟ جداسازی یک یا چند ژن و تکثیر آنها را همسانه سازی دنای می گویند . | ۵ |
| ۰/۲۵ | ۸۹/۱۰-۹۰/۴ | نقش ناقل در مهندسی ژنتیک چیست ؟ در همسانه سازی DNA ، ماده و راستی با ابزارهای مختلفی در خارج از سلول تهیه و به وسیله یک ناقل همسانه سازی به درون ژنوم میزبان منتقل می شود. | ۶ |
| ۱ | ۹۱/۶ | چهار مرحله ی اساسی روش های مهندسی ژنتیک را نام ببرید . ۱- جداسازی قطعه های از دنا -۲- اتصال قطعه دنا به ناقل و تشکیل دنای نوترکیب -۳- وارد کردن دنای نوترکیب به یاخته میزبان -۴- جداسازی یاخته های تراژنی | ۷ |
| ۰/۲۵ | ۹۶/۳ | مهندسان ژنتیک ، نخست ژن مورد نظر را چگونه از بقیه DNA جاندار جدا می کنند ؟ | ۸ |
| ۰/۲۵ | ۹۰/۱۲-۹۲/۶ | در مهندسی ژنتیک برای بریدن DNA از آنزیم های استفاده می شود . | ۹ |
| ۰/۷۵ | ۹۵/۳ - ۹۰/۱۰ | الف) جایگاه تشخیص آنزیم برش دهنده ECOR1 ، کدام توالی نوکلئوتیدی است ؟ ب) برش این آنزیم یعنی کدام نوکلئوتیدها است ؟ پاسخ الف) $\frac{GAATTC}{CTTAAG}$ | ۱۰ |
| ۰/۷۵ | ۸۹/۱۰ | کدام یک از توالی یا توالی های زیر می تواند جایگاه تشخیص برای یک آنزیم محدود کننده باشد ؟ چرا ؟ الف) $\frac{CCAGGA}{GGTCCT}$ (د) $\frac{AGCT}{TCGA}$ (ج) $\frac{ACCGGT}{TGGCCA}$ (ب) $\frac{CATCA}{GTAGT}$ پاسخ: توالی های «ب» و «ج» زیرا توالی دو رشته ای جایگاه تشخیص آنها عکس همدیگر است . | ۱۱ |
| ۰/۷۵ | ۹۰/۶ ۹۸/۶ | سه مورد از ویژگی های پلازمیدها را بنویسید . پلازمید یک مولکول DNA دو رشته ای و حلقه ای خارج کروموزومی است که معمولاً درون باکتری ها و بعضی قارچ ها مثل محمرها وجود دارد و می تواند مستقل از ژنوم میزبان همانندسازی کند . پلازمید ها را کروموزوم های کمکی نیز می نامند . | ۱۲ |
| ۰/۵ | -۸۸/۸/۱۰ ۹۶/۱۰ | چرا به پلازمیدها ، کروموزوم های کمکی نیز گفته می شود ؟ پاسخ: چون حاوی ژن هایی هستند که در کروموزوم اصلی باکتری وجود ندارند. مثلاً ژن مقاومت به آنتی بیوتیک در پلازمید قرار دارد. | ۱۳ |
| ۱ | ۸۹/۱۲-۹۳/۳ | در مهندسی ژنتیک ، برای ساخت DNA نوترکیب ، از کدام آنزیم ها استفاده می شود و هر یک از این آنزیم ها چه نقشی بر عهده دارد ؟ از آنزیم برش دهنده برای بریدن پلازمید و ژن مورد نظر (۰/۵) و آنزیم لیگاز برای برقراری پیوند فسفو دی استر بین دو DNA (۰/۵) استفاده می شود. | ۱۴ |
| ۰/۵ | ۹۷/۱۰ | دو آنزیم مورد استفاده در مهندسی ژنتیک را نام ببرید . | ۱۵ |
| ۰/۲۵ | ۹۲/۳ | در کدام یک از مراحل زیر از آنزیم DNA لیگاز استفاده می شود ؟ (۱) برش DNA (۲) تولید DNA نوترکیب | ۱۶ |
| ۰/۲۵ | ۸۸/۱۲ | منظور از بریدن DNA چیست ؟ | ۱۷ |
| ۰/۵ | ۸۸/۱۲ | ویژگی های دو انتهای چسبنده قطعات DNA را بنویسید . قطعاتی از DNA کوتاه تک رشته (۰/۲۵) که با یکدیگر مکمل هستند . (۰/۲۵) | ۱۸ |
| ۰/۲۵ | ۹۴/۶ | اتصال انتهای چسبنده پلازمید به انتهای چسبنده ژن خارجی توسط کدام پیوند صورت می گیرد ؟ پیوند هیدروژنی | ۱۹ |
| ۰/۲۵ | ۹۱/۴ | برای برقراری پیوند فسفو دی استر میان دو مولکول DNA ، مهندسان ژنتیک از آنزیمی به نام آنزیم لیگاز استفاده می کنند . | ۲۰ |
| ۰/۲۵ | ۹۶/۳ | در برقراری پیوند میان دو DNA ، به منظور تشکیل DNA نوترکیب ، کدام آنزیم استفاده می شود ؟ لیگاز | ۲۱ |
| ۰/۲۵ | ۹۵/۶ | آنژیمی که برای برقراری پیوند فسفو دی استر میان دو مولکول DNA ، ژن خارجی و پلازمید به کار می رود چه نام دارد ؟ | ۲۲ |

| | | | |
|------|-------|--|----|
| ۰/۲۵ | ۸۹/۱۰ | چرا برای بروید پلازمید مورد استفاده در DNA نوترکیب ، از همان آنزیمی استفاده می شود که ژن خارجی با آن بروید شده است ؟ برای این که بتوان انتهای چسبنده یکی را به انتهای چسبنده دیگری متصل کرد . | ۲۳ |
| ۰/۲۵ | ۹۸/۶ | در مهندسی ژنتیک به مجموعه دنای ناقل و ژن جاگذاری شده در آن ، چه می گویند ؟ | ۲۴ |
| ۰/۷۵ | ۹۱/۴ | شکل زیر دو مولکول DNA را نشان می دهد . با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید : الف) کدام شکل ، DNA ی یک پلازمید را نشان می دهد ؟ شکل ۲ ب) بخشی از مولکول DNA که با A مشخص شده ، چه چیزی را نشان می دهد ؟ انتهای چسبنده ج) اگر این دو قطعه ی DNA به هم وصل شوند ، مولکول DNA ی حاصل چه نامیده می شود ؟ DNA نوترکیب  | ۲۵ |
| ۰/۲۵ | ۹۷/۱۰ | برای وارد کردن دنای نوترکیب به باکتری ، با چه روشی در دیواره باکتری منافذی ایجاد می شود ؟(یک مورد) با کمک شوک الکتریکی و یا شوک حرارتی همراه با مواد شیمیایی ایجاد کرد . | ۲۶ |
| ۰/۵ | ۹۰/۴ | هدف از انجام مرحله جداسازی سلول های تراژنی چیست ؟ همه باکتری ها DNA نوترکیب را دریافت نمی کنند. بنابراین لازم است باکتری دریافت کننده پلازمید از باکتری فاقد آن تفکیک شود . | ۲۷ |
| ۰/۲۵ | ۹۴/۱۰ | در باکتری ها ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک در کدام DNA وجود دارد ؟ پلازمید | ۲۸ |
| ۰/۲۵ | ۹۰/۱۲ | در کدام مرحله از آزمایش هایی مهندسی ژنتیک از آنتی بیوتیک استفاده می شود ؟ مرحله جداسازی سلول های تراژنی | ۲۹ |
| ۰/۲۵ | ۸۸/۱۲ | برای جداسازی سلول های تراژنی در مهندسی ژنتیک ، چه ماده ای را به محیط کشت باکتری اضافه می کنند ؟ آنتی بیوتیک | ۳۰ |
| ۰/۵ | ۹۲/۳ | به چه دلیل باکتری هایی که DNA نوترکیب را جذب کرده اند ، نسبت به یک آنتی بیوتیک خاص مقاوم شده اند ؟ پاسخ : زیرا پلازمید حاوی ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک است . | ۳۱ |
| ۱ | ۹۸/۳ | در جدول زیر ، هر یک از موارد ستون «الف» با یکی از موارد ستون «ب» ارتباط منطقی دارد . آن ها را پیدا کنید و بنویسید . (در ستون «ب» یک مورد اضافه است) | ۳۲ |

| ستون «ب» | ستون «الف» |
|--------------------------|---|
| ECOR1 آنزیم | ۱- ایجاد منافذی در دیواره باکتری |
| آمپی سیلین | ۲- اتصال دنای مورد نظر به دیسک (پلازمید) |
| ناقل همسانه سازی (وکتور) | ۳- ایجاد انتهای چسبنده |
| آنزیم لیگاز | ۴- جداسازی یاخته های تراژنی |
| شوک الکتریکی | ۱- شوک الکتریکی ۲- آنزیم لیگاز ۳- آمپی سیلین ۴- آنتی بیوتیک |

فناوری مهندسی پروتئین و بافت

| | | | |
|------|-------|---|----|
| ۰/۲۵ | ۹۷/۱۰ | لخته ها به طور طبیعی در بدن توسط کدام آنزیم تجزیه می شوند ؟ | ۳۳ |
| ۰/۲۵ | ۹۸/۳ | یک پروتئین که با مهندسی پروتئین ، پایداری آن در مقابل گرمای افزایش یافته است را نام ببرید . آمیلаз | ۳۴ |
| ۰/۵ | ۹۸/۶ | چگونه می توان با مهندسی پروتئین مدت زمان فعالیت پلاسمایی و اثرات درمانی پلاسمین را بیشتر کرد ؟ جانشینی یک آمینواسید پلاسمین (۰/۲۵) با آمینواسید دیگری در توالي (۰/۰) | ۳۵ |
| ۰/۲۵ | ۹۸/۳ | یاخته های بنیادی بالغ در کدام بخش از بدن ، می توانند در محیط کشت به رگ های خونی تمایز پیدا کنند ؟ یاخته های بنیادی مغز استخوان | ۳۶ |

کاربرد زیست فناوری در کشاورزی

| | | | |
|-----|-------|--|----|
| ۰/۵ | ۸۹/۱۰ | از موارد استفاده مهندسی ژنتیک در کشاورزی دو مثال بنویسید . تولید گیاهان مقاوم در برابر بعضی آفات ها - اصلاح بذر برای تولید گیاهان مطلوب - تولید گیاهان مقاوم به خشکی و شوری - تنظیم سرعت رسیدن میوه ها - افزایش ارزش غذایی محصولات - تولید گیاهان زراعی مقاوم به علف کش ها | ۳۷ |
|-----|-------|--|----|

کاربرد زیست فناوری در پزشکی

| | | | |
|----------------|---------------|---|----|
| ۰/۵ | ۹۸/۶ | دو مورد از کاربردهای زیست فناوری در پژوهشکی را نام ببرید . ۱- تولید دارو ۲- تولید واکسن ۳- ژن درمانی ۴- تشخیص بیماری | ۳۸ |
| ۰/۵ | ۹۷/۱۰ | مهم ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک چیست ؟ تبدیل انسولین غیر فعال به انسولین فعال | ۳۹ |
| ۰/۲۵ | ۹۸/۳ | با جدا شدن کدام زنجیره ، پیش انسولین به انسولین فعال تبدیل می شود ؟ زنジره ۵ | ۴۰ |
| ۰/۲۵ | ۹۴/۱۰ | در مهندسی ژنتیک کدام داروی پروتئینی جهت درمان دیابت ساخته شده است ؟ انسولین | ۴۱ |
| ۰/۷۵ | ۸۸/۱۲ | واکسن چیست ؟ میکروب ضعیف یا کشته شده و یا سم خالص غیر فعال آن ها . | ۴۲ |
| ۰/۵ | ۸۹/۱۰ | واکسن هایی که در گذشته با استفاده از میکروب کشته یا ضعیف شده تهیه می شد چه خطراتی داشتند ؟ توضیح دهید . چنانچه در مراحل تولید واکسن خطای رخ دهد ، احتمال بروز بیماری در اثر مصرف آن وجود دارد . | ۴۳ |
| ۰/۲۵ | ۸۸/۱۲ | ساختن واکسن به روش مهندسی ژنتیک چه مزیتی نسبت به روش های گذشته دارد ؟ چنانچه در مراحل تولید واکسن خطای رخ دهد ، احتمال بروز بیماری در اثر مصرف آن وجود دارد . واکسن های تولید شده با روش مهندسی ژنتیک چنین خطری ندارند . | ۴۴ |
| ۰/۲۵ | ۹۱/۴ | برای تهیه ی واکسن به روش مهندسی ژنتیک ، ژن مربوط به از عامل بیماری زا جدا می شود . آنثی ژن سطحی | ۴۵ |
| ۰/۲۵ | ۹۸/۳ | برای تولید واکسن به روش مهندسی ژنتیک ، کدام ژن عامل بیماری زا به یک باکتری یا ویروس غیر بیماری زا منتقل می شود ؟ ژن مربوط به پادگن (آنثی ژن) سطحی | ۴۶ |
| ۰/۵ | ۸۸/۱۰-۹۷/۱۰ | ژن درمانی را تعریف کنید . یعنی قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته های فردی که دارای نسخه ای ناقص از همان ژن است . | ۴۷ |
| ۰/۲۵ | ۹۸/۳ | به قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته های فردی که دارای نسخه ای ناقص از همان ژن است ، ژن درمانی می گویند . | ۴۸ |
| ۰/۲۵ | ۹۶/۱۰ | بسیاری از بیماری های ژنتیک زمانی ایجاد می شوند که فرد نسخه یک ژن خاص را نداشته باشد . سالم | ۴۹ |
| ۰/۲۵ | ۹۰/۱۲ | اولین ژن درمانی مربوط به ناهنجاری در کدام دستگاه بدن انسان بود ؟ دستگاه ایمنی | ۵۰ |
| ۰/۲۵ | ۹۵/۳ | پزشکان در اولین تلاش های خود از کدام سلول ها برای درمان کودک مبتلا به ناهنجاری دستگاه ایمنی استفاده کردند ؟ لنفوسيت | ۵۱ |
| ۰/۲۵ | ۹۵/۳ | سلول های حاصل از مهندسی ژنتیک ، در نسل های بعدی پس از ژن درمانی چه ویژگی را کسب می کنند ؟ این سلول ها توانستند آنزیم مورد نیاز بدن را بسازند . | ۵۲ |
| ۰/۵ | ۹۷/۱۰ ۹۸/۶ | چرا تشخیص زود هنگام آلودگی با ویروس ایدز اهمیت زیادی دارد ؟ زیرا باعث می شود که بدون اتلاف وقت اقدامات درمانی و پیشگیری لازم برای جلوگیری از انتقال ویروس به سایر افراد صورت گیرد . | ۵۳ |
| درست یا نادرست | | | |
| غ | ۹۴/۶ | کدام یک از عبارات زیر صحیح و کدام یک نادرست است ؟ پلازمیدها نمی توانند مستقل از کروموزوم اصلی باکتری همانند سازی کنند . | ۱ |
| غ | ۹۳/۱۰ | پلازمیدها ، مولکول های DNA حلقوی کوچکی هستند که در همه باکتری ها وجود دارند . | ۲ |
| ص | ۹۰/۱۲ | در واکسن هایی که با روش های مهندسی ژنتیک ساخته می شوند ، می توان ژن مربوط به آنثی ژن یک بیماری زا را به DNA یک باکتری یا ویروس غیر بیماری زا وارد کرد . | ۳ |
| ص | ۹۸/۳ | تشخیص زود هنگام آلودگی با ویروس ایدز برای جلوگیری از انتقال ویروس به سایر افراد اهمیت زیادی دارد . | ۴ |
| ص | ۹۸/۶ | یاخته های بنیادی کبد می توانند تکثیر شوند و به یاخته کبدی یا یاخته مجرای صفوایی تمایز پیدا کنند . | ۵ |

